



הוראה למתן טיפול ב- CLEXANE למניעת ארועים טרומבו-אמבולים (VTE) סביב ניתוח מתוכנן

פרטי החולה:
מדבקה גדולה

הניתוח:

א. גורמי סיכון:

RFs(risk factors) with value of 1 point	RFs with value of 2 points	RFs with value of 3 points	TOTAL SCORE
<input type="checkbox"/> Age 41-60 years <input type="checkbox"/> Prior history of postoperative DVT <input type="checkbox"/> Family history of DVT or PE <input type="checkbox"/> Leg swelling, ulcers, stasis, varicose veins <input type="checkbox"/> MI/CHF <input type="checkbox"/> Stroke with paralysis <input type="checkbox"/> Inflammatory bowel disease <input type="checkbox"/> Central line <input type="checkbox"/> General anesthesia time >2 hours <input type="checkbox"/> Pregnancy, or postpartum<1 month <input type="checkbox"/> Obesity (BMI>30kg/m ²) <input type="checkbox"/> Hyperviscosity syndromes <input type="checkbox"/> Estrogen therapy	<input type="checkbox"/> Age 61-70 years <input type="checkbox"/> History of unprovoked/idiopathic DVT <input type="checkbox"/> Major surgery** <input type="checkbox"/> Malignancy <input type="checkbox"/> Multiple trauma <input type="checkbox"/> Spinal cord injury with paralysis	<input type="checkbox"/> Age over 70 years <input type="checkbox"/> Prior history of PE <input type="checkbox"/> thrombophilia *	

* Thrombophilia includes Factor V Leiden, and prothrombin variant mutations; anticardiolipin antibody syndrome; antithrombin, protein C or protein S deficiency; hyperhomocysteinemia; myeloproliferative disorders

** Major surgery : 1. All GI surgery , except laparoscopic cholecystectomy and appendectomy.
2. mastectomy

ב. הוראה למתן CLEXANE על-פי קבוצת סיכון:

הטיפול (הקף בעיגול זמן תחילת טיפול אחרי ניתוח 12 ש" או 24 ש")	גורמי סיכון Total score	קבוצת הסיכון	הוראה למתן Clexane סמן ב- X
מנה חד פעמית של SC CLEXANE 40mg עד 19:00 בערב הניתוח			
ניוד מהיר בלבד	0	נמוכה	
SC CLEXANE 40 mgX1/d החל מ- 12 ש" / 24 ש" אחרי הניתוח, עד לניוד מלא	1-2	בינונית	
SC CLEXANE 40 mgX1/d החל מ- 12 ש" / 24 ש" אחרי הניתוח, למשך 10 ימים.	3-4	גבוהה	
SC CLEXANE 40 mgX1/ d החל מ- 12 ש" / 24 ש" אחרי הניתוח, למשך 4 שבועות + IPC (intermittent pneumatic compression)	מעל 4	גבוהה מאוד	
מנה חד פעמית של SC CLEXANE 20mg עד 19:00 בערב הניתוח			
SC CLEXANE 20 mgX1/d החל מ- 12 ש" / 24 ש" אחרי הניתוח עד: ניוד מלא / 10 ימים / 4 שבועות			
	חולה עם אי-ספיקת כליות קשה (Cr Cl<30 ml/min)		

* הוריות נגד למתן CLEXANE - HIT בעבר; מסתם מיטרלי מלאכותי, אלרגיה להפרינים, PLT<60000

* הוריות נגד לשימוש ב- IPC - בצקות קשות בגפיים על רקע CHF, מחלת עורקים פריפרים קשה, דרמטיטיס.